

اثر ۱۲ هفته تمرین هوایی بر سطوح کاتکولامین‌ها و آمادگی قلبی تنفسی دانشآموزان مبتلا به اختلال بیشفعالی / نقص توجه

صالح افراسیابی^۱، مهدی کارگرفرد^۲

۱. کارشناس ارشد دانشگاه اصفهان

۲. دانشیار دانشگاه اصفهان*

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۳/۰۹/۰۱

تاریخ دریافت: ۱۳۹۲/۱۱/۲۷

چکیده

هدف از مطالعه حاضر، تعیین اثر ۱۲ هفته تمرین هوایی بر سطوح کاتکولامین‌ها و آمادگی قلبی تنفسی در دانشآموزان مبتلا به اختلال بیشفعالی / نقص توجه بود. در یک مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل، ۶۰ نفر دانشآموز بیشفعال مقطع ابتدایی از بین دانشآموزان مبتلا به اختلال بیشفعالی / نقص توجه با استفاده از پرسش‌نامه تشخیصی کانرز بهصورت داوطلبانه انتخاب شده و سپس، بهصورت تصادفی در دو گروه کنترل (۳۰ نفر، میانگین سن: ۱۱/۱۴ ± ۰/۵۲ سال؛ وزن: ۱۰/۴۰ ± ۰/۵۳ کیلوگرم؛ شاخص توده بدنی: ۱/۹۷ ± ۰/۶۱ کیلوگرم بر مجدور قد به متراژ و اوج اکسیژن مصرفی: ۲۹/۷۵ ± ۴/۸۰ میلی لیتر کیلوگرم بر دقیقه) و تجربی (۳۰ نفر، میانگین سن: ۱۰/۶۷ ± ۰/۱۸ سال؛ وزن: ۱۴/۴۲ ± ۰/۴۰ کیلوگرم؛ شاخص توده بدنی: ۱/۷۳ ± ۰/۱۸ کیلوگرم بر مجدور قد به متراژ و اوج اکسیژن مصرفی: ۲۶/۱۴ ± ۰/۰۶ میلی لیتر کیلوگرم بر دقیقه) قرار گرفتند. گروه تجربی در یک برنامه تمرین هوایی بهمدت ۱۲ هفته و هر هفته سه جلسه با شدت ۸۵-۸۰٪ ضربان قلب ذخیره بیشینه به تمرین پرداختند. در حالی که گروه کنترل در طول این دوره در هیچ برنامه فعالیت بدنی منظمی شرکت نکردند. نمونه اداره برای اندازه‌گیری سطوح کاتکولامین‌ها و اوج اکسیژن مصرفی با استفاده از دستگاه گاز آنالایزر بر روی نوارگردان برای اندازه‌گیری آمادگی قلبی تنفسی، قبل و بعد از ۱۲ هفته برنامه تمرینی اجرا گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری‌های تکراری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بعد از ۱۲ هفته برنامه تمرین هوایی، افزایش معناداری در اوج اکسیژن مصرفی و کاهش معناداری در ضربان قلب استراحت و سطوح اپی نفرین در گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد ($P < 0.001$). علی‌رغم کاهش معنادار سطوح نوراپی‌نفرین در گروه تجربی ($P < 0.05$)، تفاوت معناداری در سطوح نوراپی‌نفرین بین گروه‌ها پس از ۱۲ هفته تمرین هوایی مشاهده نشد ($P > 0.05$). یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که یک برنامه ۱۲ هفته‌ای تمرین هوایی ممکن است در بهبود سطوح کاتکولامین‌ها، به ویژه اپی نفرین و آمادگی قلبی تنفسی کودکان مبتلا به اختلال بیشفعالی و کم‌توجهی مؤثر باشد.

واژگان کلیدی: آمادگی قلبی تنفسی، کاتکولامین‌ها، کودکان بیشفعال، تمرین هوایی

مقدمه

یکی از شایع‌ترین اختلالات در کودکان، اختلال کمبود توجه و بیشفعالی (ADHD)^۱ است که با عالیم کمبود توجه/ بیشفعالی و تکانش‌گری مشخص می‌شود (۱). این اختلال بهویژه در کودکان سینین دبستانی، با مشکلات بسیاری در زمینه‌های مختلف آموزشی، عملکرد تحصیلی پایین، ضعف روحیه، پرخاشگری، ترک مدرسه، روابط خانوادگی و دوستانه ضعیف، اضطراب، افسردگی و نقص در بسیاری از مهارت‌ها همراه است (۲). در ۱۰ سال گذشته، در ایالات متحده ۷٪ و در انگلستان ۳۵٪ در این بیماری افزایش گزارش گردیده است (۳). در مطالعات همه‌گیرشناسی، شیوع اختلال در ۲۶۶۷ کودک دختر و پسر هفت تا ۱۲ ساله شهر تهران در دامنه‌ای بین سه تا شش درصد، در دانش‌آموزان دبستانی شهر نیشابور ۱۲/۵ درصد و در دانش‌آموزان دبستانی شهر شیراز نیز پنج تا ۸/۵ درصد گزارش شده است (۴). مطالعات نشان می‌دهد که ۳۰-۶۰ درصد از افراد مبتلا به این بیماری، علائم این اختلال شامل ارتباط با انواع مختلف بیماری‌های روان‌پزشکی و نارسایی ناقل کاتکولامین در کرتکس قدمی (پیشانی) و نواحی قشری را تا بزرگسالی به همراه دارند (۸،۹). مطالعات و تصاویر عصبی - بیولوژیکی نشان می‌دهند بچه‌های مبتلا به ADHD، معمولاً کمبود کاتکولامین‌ها را از خود بروز می‌دهند (۱۰) که این می‌تواند از طریق آزمون‌های بیوشیمیایی - فیزیکی و شناختی مشخص شود (۱۱).

یکی از فرضیه‌های پیش‌رو، پاتوفیزیولوژی براساس مفهوم نارسایی کاتکولامین (نوراپی‌نفرین، اپی‌نفرین، دوپامین) می‌باشد (۱۲). این فرضیه در درجه اول از این مشاهدات برگرفته شده است که داروهایی مانند متیل فنیدات و آمفتامین که سازگار با کاتکولامین به شمار می‌روند، در درمان علائم ADHD مؤثر می‌باشند (۱۳). بهدلیل علائم موجود در رابطه با نارسایی عصبی - بیولوژیکی در افراد مبتلا به ADHD، درمان عمدۀ برای این اختلال، دارویی می‌باشد که بهویژه سیستم‌های ناقل کاتکولامین را هدف قرار می‌دهد.

raig ترین و مهم‌ترین درمان پیشنهادی برای کودکان مبتلا به اختلال ADHD، دارودرمانی می‌باشد؛ به طوری که حدود ۷۵ درصد این کودکان، تحت درمان مؤثر با داروهای محرک‌زا از قبیل متیل فنیدات (مانند ریتالین) یا آمفتامین (مانند آدرنال)، دکستروآمفتامین^۲ و پمولین^۳ (سیلرت)^۴ قرار می‌گیرند (۱۴،۱۵). این داروها میزان دوپامین را در سیستم عصبی مرکزی افزایش می‌دهند (۱۶).

-
1. Attention deficit-hyperactivity disorder
 2. Dextroamphetamine
 3. Pemoline
 4. Cylert

پاسخ بالینی به متیل فنیدات، با بهبود و تعامل کاتکولامین و دریافت کننده‌های مربوطه روی نواحی پیشانی و قشری کورتکس مرتبط می‌باشد (۱۸، ۱۷). در بسیاری از افراد، این‌گونه داروها به‌طور قابل ملاحظه‌ای بیش‌فعالی را کاهش می‌دهند و توانایی آن‌ها را برای تمرکز در کار و یادگیری بهبود می‌بخشند (۱۹).

به‌عقیده صاحب‌نظران و پژوهشگران با توجه به فواید بسیاری که دارودرمانی دارد، ضررهايی نیز برای کودکان دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به کاهش اشتها، کاهش وزن، اختلال در خواب، توهمندی، افسردگی، افزایش فشار خون، غمگینی و یا گریستن اشاره کرد (۲۰).

پژوهش‌های گسترده، فواید سلامتی جسمانی و روانی را ناشی از شرکت در فعالیت‌های بدنی و ورزشی از قبیل کاهش نرخ مرگ‌ومیر (۲۱)، کاهش خطر بیماری قلبی کرونری (۲۲، ۲۳) و بهبود افسردگی و اضطراب (۲۴، ۲۵) نشان داده‌اند. درواقع، شواهد محکمی وجود دارد که فعالیت ورزشی همراه با داروهای ضدافسردگی، در درمان اختلال افسردگی شدید قابل قیاس است (۲۶). یکی از نکات پژوهش درمورد بچه‌ها این است که شرکت فعالانه در ورزش و تمرین می‌تواند یک تواندی که توالي سودمند عاطفی را مانند کاهش افکار منفی، افزایش عزت‌نفس و افزایش احساس آرامش داشته باشد (۲۷).

در حال حاضر، فعالیت ورزشی یکی از روش‌های درمانی اختلال بیش‌فعالی در کودکان است که به عنوان یک محرک قوی برای سیستم‌های هیپو‌تالاموسی، مخاطی - آدرنالی، هیپوفیزی و نور آدرنرژیک شناخته شده است (۲۸). نظرات موافق بسیاری در ارتباط با بهبود عملکرد اجرایی از طریق فعالیت جسمانی وجود دارد که به‌ویژه برای کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی حائز اهمیت می‌باشد. تمرین هوایی، تأثیرات مثبتی را روی کنترل اجرایی (یعنی برنامه‌ریزی، زمان‌بندی، حافظه کاری، کنترل مداخله‌ای، هماهنگ کردن کارها و غیره) در بزرگسالان سالم (۲۹)، سالم‌دان (۳۰) و بیماران افسرده (۳۱) نشان داده است.

با توجه به دانش ما، تاکنون بررسی پاسخ پژوهش بر سطوح کاتکولامین‌ها با استفاده از تمرینات ورزشی در کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی کمتر گزارش شده است. فرض ما بر این است که افزایش بارز طبیعی در کاتکولامین‌های گردش خون در پاسخ به تمرین ورزشی، در کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی کند خواهد شد؛ لذا، پژوهشگر برای آزمایش این مسئله در این پژوهش بر آن است تا اثر ۱۲ هفته تمرین هوایی با شدت متوسط تا شدید را بر سطوح اپی‌نفرین و نوراپی‌نفرین و آمادگی قلبی تنفسی را در کودکان پسر مقطع ابتدایی مبتلا به اختلال ADHD مورد مطالعه قرار دهد.

روش پژوهش

پژوهش حاضر از نوع نیمه‌تجربی با استفاده از طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش‌آموزان بیش‌فعال مقطع ابتدایی شهرستان اصفهان در سال تحصیلی ۹۰-۹۱ تشکیل می‌دادند. پس از تعیین بیش‌فعالی آزمودنی‌ها با استفاده از پرسش‌نامه تشخیصی کانرز^۱ (۳۲) توسط پزشکان معالج، از آزمون فشار ورزشی بر اساس پروتکل بروس^۲ نیز به عنوان فعالیت هوایی درمانده‌ساز و یکسان‌سازی اکسیژن مصرفی بیشینه استفاده شد. در یک جلسه توجیهی، موضوع پژوهش، اهداف و روش اجرای آن (نحوه اجرای آزمون ورزشی بروس، نحوه اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش، برنامه تمرینی و چگونگی مصرف دارو و شبیدارو)، فواید و آسیب‌های احتمالی، فرم‌های مخصوص رضایت‌نامه و پرسش‌نامه سوابق پزشکی ورزشی و بیماری در اختیار آزمودنی‌ها و والدین آن‌ها قرار گرفت و از آن‌ها درخواست شد در صورت تمایل به شرکت در پژوهش، اسمی خود را اعلام کنند. در نهایت، تعداد ۶۰ نفر از دانش‌آموزان بیش‌فعال با میانگین سنی $۱۰/۲۱ \pm ۷/۴۳$ سال به‌طور داوطلبانه، انتخاب و سپس، به‌صورت تصادفی در دو گروه کنترل (۳۰ نفر، میانگین سن: $۱۰/۵۳ \pm ۱/۱۴$ سال؛ وزن: $۲۹/۷۵ \pm ۴/۸۰$ کیلوگرم؛ شاخص توده بدنی: $۱۸/۰۶ \pm ۱/۹۷$ کیلوگرم بر مجدور قد به متر و اوج اکسیژن مصرفی: $۲۶/۷۷ \pm ۶/۸۴$ میلی‌لیتر کیلوگرم بر دقیقه) و تجربی (۳۰ نفر، میانگین سن: $۱/۱۸ \pm ۱/۱۸$ سال؛ وزن: $۱۰/۶۷ \pm ۱/۰۱$ کیلوگرم؛ شاخص توده بدنی: $۱۸/۱۴ \pm ۱/۷۳$ کیلوگرم بر مجدور قد به متر و اوج اکسیژن مصرفی: $۲۶/۱۴ \pm ۵/۰۶$ میلی‌لیتر کیلوگرم بر دقیقه) قرار گرفتند. پس از اخذ رضایت‌نامه از دانش‌آموزان و والدین آن‌ها و تکمیل پرسش‌نامه‌های بدنی و پزشکی، برخی از شاخص‌های بدنی و فیزیولوژیکی شامل: سن، قد، وزن، شاخص توده بدنی، ضربان قلب استراحت، اوج اکسیژن مصرفی، اپی‌نفرین و نوابی‌نفرین افراد طی دو جلسه جداگانه قبل و بعد از مطالعه اندازه‌گیری و ثبت شد.

یک هفته قبل از اجرای برنامه تمرینی، ویژگی‌های بدنی آزمودنی‌ها شامل وزن، قد و شاخص توده بدنی اندازه‌گیری و ثبت شد. وزن آزمودنی‌ها با استفاده از ترازوی عقرهای با دقت $۰/۱$ کیلوگرم به صورت استاندارد و حداقل لباس و قد با استفاده از دستگاه قدسنج مدل سکا ساخت کشور آلمان با دقت $۰/۱$ سانتی‌متر اندازه‌گیری و ثبت شد. شاخص توده بدنی نیز با استفاده از نسبت وزن (کیلوگرم) به مجدور قد (متر) محاسبه شد و در جدول مخصوص ثبت داده‌ها وارد گردید. از آزمون فشار ورزشی بر اساس پروتکل بروس بر روی نوار گردان HP Cosmos مدل LE100-720CE نیز به منظور برآورد اوج اکسیژن مصرفی بیشینه (به صورت میلی‌لیتر در هر کیلوگرم در دقیقه)

-
1. Conners C
 2. Bruce protocol stress test

آزمودنی‌های هر دو گروه استفاده شد. جهت اندازه‌گیری اوج اکسیژن مصروفی، گازهای دمی و بازدمی هر یک از دانش‌آموزان، از دستگاه آنالیز گازهای تنفسی با نام گانشورن^۱ مدل پاور کیوب^۲ ساخت کشور آلمان استفاده گردید. این دستگاه، قابلیت اندازه‌گیری متغیرهای گوناگونی در یک وهله زمانی را دارد و در بسیاری از پژوهش‌ها از آن به عنوان وسیله‌ای معتبر نام برده شده است (۳۳). دستگاه فوق حاوی یک خازن، مجرای انتقال و ماسک هافمن^۳ که بر روی سر و در جلوی دهان آزمودنی قرار می‌گیرد می‌باشد. خاصیت ضد رطوبتی این دستگاه مانع از انتقال رطوبت تنفس و محیط به دستگاه می‌شود که در نهایت، نتایج پایانی را ارائه می‌دهد.

سپس، گروه تجربی در یک برنامه تمرینات هوایی به مدت ۱۲ هفته و هر هفته سه جلسه با شدت ۶۰-۸۵ درصد ضربان قلب ذخیره بیشینه بر اساس توانایی‌های فیزیولوژیکی حاصل از آزمون ورزش براساس ضربان قلب هدف به تمرین پرداختند. برای رعایت اصل اضافه‌بار و اثربخشی تمرینات، چهار هفتۀ اول به مدت ۲۵ دقیقه فعالیت هوایی با شدت ۶۰ تا ۷۵ درصد ضربان قلب ذخیره بیشینه و هشت هفتۀ دیگر به صورت ۳۵ دقیقه فعالیت هوایی با شدت ۷۰ تا ۸۵ درصد ضربان قلب ذخیره بیشینه انجام شد (۳۳،۳۴). با توجه به سن و توانایی‌های فیزیولوژیکی و دیگر شرایط آزمودنی‌ها سعی شد از فعالیت‌هایی استفاده شود که برای کودکان تنوع داشته باشد و حس رقابت را در آنان برانگیزد. به منظور کنترل شدت تمرینات بر اساس ضربان قلب، از فرستنده الکتریکی هارت ریت مونیتور^۴ مدل پلار T, 31 ساخت کشور فنلاند استفاده شد. لازم به ذکر است گروه کنترل در این مدت، فقط پیگیری شدند و زندگی عادی خود را ادامه دادند.

برای بررسی تغییرات سطوح اپی‌نفرین و نوراپی‌نفرین آزمودنی‌ها، از کیت Bi-CAT ELISA و با روش Enzyme Linked of Immunosorbent assay از طریق نمونه ادرار انجام شد. به این صورت که، پس از جمع‌آوری ظروف نمونه‌گیری و تعیین حجم ادرار، مقدار ۱۰۰ سی سی از آن‌ها را در لوله آزمایش ریخته و پس از درج کد مربوط به هر آزمودنی، در ظرفی حاوی یخ خشک، نگهداری شده و در شرایط سرد و به دور از نور آفتاب به آزمایشگاه منتقل گردیدند. نمونه‌ها تا زمان تجزیه آزمایشگاهی، در دمای ۲۰ درجه زیر صفر نگهداری شدند. ارتباطی قوی بین کاتکولامین‌های ادراری و پلاسمای، هم در حالت استراحت و هم در حالت تمرین وجود داشت ($r=0.90$). لازم به ذکر است، برای

1. Ganshorn

2. Power Cube LF8.5G

3. Hoffman

4. Heart Rate Monitor

کاهش اثر ریتم شبانه‌روزی، همه نمونه‌ها در ساعت مشابه و یکسان از روز (هشت تا ۱۰ صبح) جمع‌آوری گردید.

پس از جمع‌آوری داده‌ها، ابتدا تمامی متغیرهای کمی توسط آزمون کولموگروف - اس‌میرنوف از نظر طبیعی بودن توزیع داده‌ها بررسی و تأیید شدند. سپس برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری مناسب از قبیل آمار توصیفی و آمار استنباطی متناسب با سطح سنجش داده‌ها نظری آزمون تی مستقل برای مقایسه داده‌های اولیه و همتاسازی گروه‌ها، آزمون تی وابسته برای بررسی تغییرات درون‌گروهی و آزمون تجزیه و تحلیل واریانس‌ها با اندازه‌گیری‌های تکراری برای مقایسه میانگین‌های متغیرهای مورد مطالعه بین گروه‌های مورد بررسی با استفاده از نرم‌افزار اس.بی.اس.بی.اس. ویرایش ۱۸ در سطح ۰.۰۵ استفاده شد.

نتایج

بر اساس داده‌های جمع‌آوری شده، بین میانگین کلیه متغیرهای بدنی مانند سن ($P=0.66$)، قد ($P=0.40$)، وزن ($P=0.56$)، شاخص توده بدنی ($P=0.87$) و شاخص‌های فیزیولوژیکی از قبیل اوج اکسیژن مصرفی ($P=0.69$) و ضربان قلب استراحت ($P=0.53$) و همچنین، شاخص‌های بیوشیمیایی از قبیل اپی‌نفرین ($P=0.59$) و نوراپی‌نفرین ($P=0.84$) در گروه‌های تجربی و کنترل، قبل از مطالعه با استفاده از آزمون تی مستقل تفاوت معناداری مشاهده نشد ($P>0.05$); بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که آزمودنی‌های هر دو گروه مورد مطالعه، از نظر ویژگی‌های مورد مطالعه همگن می‌باشند و در شرایط یکسانی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند.

اثرات درون‌گروهی مطالعه حاضر نشان داد که ۱۲ هفته تمرین هوازی با شدت متوسط و بالا، موجب افزایش معنادار در اوج اکسیژن مصرفی ($P=0.001$) و کاهش معنادار در ضربان قلب استراحت ($P=0.001$) در گروه تجربی در مقایسه با قبل از دوره تمرین شد؛ در حالی که میانگین اوج اکسیژن مصرفی و ضربان قلب استراحت در گروه کنترل بدون تغییر بود ($P>0.05$) (جدول ۲). همچنین، در مقایسه بین‌گروهی، مقادیر اوج اکسیژن مصرفی ($P=0.02$) و ضربان قلب استراحت ($P=0.03$) آزمودنی‌های گروه تجربی در مرحله پس‌آزمون نسبت به گروه کنترل به‌طور معناداری بهترتبی، افزایش و کاهش معناداری را نشان داد (جدول ۱).

همچنین، یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد ۱۲ هفته تمرین هوازی با شدت متوسط و بالا، موجب کاهش معنادار در اپی‌نفرین ($P=0.001$) و نوراپی‌نفرین ($P=0.001$) در گروه تجربی در مقایسه با قبل از دوره تمرین گردید؛ در حالی که این تفاوت در گروه کنترل بدون تغییر بود ($P>0.05$) (جدول ۲). همچنین، مقایسه بین‌گروهی، تفاوت معناداری در مقادیر اپی‌نفرین ($P=0.005$) بین

آزمودنی‌های گروه‌های تجربی و کنترل نشان داد، درحالی که این تفاوت در سطوح نوراپی‌نفرین (P=0.12) بین گروه‌های مورد مطالعه معنادار نبود (جدول ۲).

جدول ۱- تغییرات درون‌گروهی و بین‌گروهی متغیر اوج اکسیژن مصرفی و ضربان قلب استراحت گروه‌های تجربی و کنترل، قبل و پس از دوره تمرینی

		تغییرات بین گروهی ††		تغییرات درون‌گروهی †		مراحل *		گروه		متغیر فیزیولوژیکی	
P	F	P	t	قبل تمرین	بعد تمرین	قبل تمرین	بعد تمرین	تجربی	کنترل	تجربی	کنترل
۰.۰۲	۶/۱۵۴	۰/۰۰۱	۱۱/۷۴	۳۴/۰.۷±۷/۰.۵	۲۶/۷۷±۶/۸۴	تجربی	اوج اکسیژن مصرفی (میلی لیتر در هر کیلوگرم بر دقیقه)	کنترل	تجربی	ضربان قلب (ضربه در دقیقه)	
		۰/۲۰	۱/۳۱۷	۲۷/۵۲±۵/۰.۷	۲۶/۱۴±۵/۰.۶	کنترل					
۰.۰۳	۴/۶۴۴	۰/۰۰۱	۵/۵۰.۹	۷۵/۰.۷±۲/۸۰	۷۸/۲۰±۳/۱۳	تجربی	ضربان قلب (ضربه در دقیقه)	کنترل	تجربی	کنترل	
		۰/۶۰	۰/۵۳۶	۷۸/۱۳±۲/۹۹	۷۷/۷۰±۳/۰.۵	کنترل					

* اعداد به صورت میانگین ± انحراف معیار بیان شده‌اند.

† سطح معناداری پذیرفته شده در سطح P<0.05 برای تغییرات درون‌گروهی

†† سطح معناداری پذیرفته شده در سطح P<0.05 برای تغییرات بین‌گروهی

جدول ۲- تغییرات درون‌گروهی و بین‌گروهی متغیرهای اپی نفرین و نوراپی نفرین گروه‌های تجربی و کنترل، قبل و پس از دوره تمرینی

		تغییرات بین گروهی ††		تغییرات درون‌گروهی †		مراحل *		گروه		متغیرهای بیوشیمیایی	
P	F	P	t	قبل از تمرین	پس از تمرین	قبل از تمرین	پس از تمرین	تجربی	کنترل	تجربی	کنترل
۰/۰۰۵	۸/۳۵۸	۰/۰۰۱	-۱۴/۸۶۴	۲۵/۲۹±۵/۴۱	۳۴/۸۷±۶/۱۹	تجربی	اپی نفرین (نانوگرم بر میلی‌لیتر)	کنترل	تجربی	کنترل	
		۰/۰۰۱	۵/۱۱۰	۳۴/۹۱±۶/۰.۸	۳۳/۹۹±۶/۲۷	کنترل					
۰/۱۲	۲/۵۴۴	۰/۰۰۱	-۱۱/۷۴	۱۰۳/۵۰±۹/۴۳	۱۱۰/۰۸±۱۱/۵۲	تجربی	نوراپی نفرین (نانوگرم بر میلی‌لیتر)	کنترل	تجربی	کنترل	
		۰/۰۰۳	۳/۲۰۹	۱۱۱/۰۸±۹/۴۴	۱۱۰/۶۴±۹/۵۱	کنترل					

* اعداد به صورت میانگین ± انحراف معیار بیان شده‌اند.

† سطح معناداری پذیرفته شده در سطح P<0.05 برای تغییرات درون‌گروهی

†† سطح معناداری پذیرفته شده در سطح P<0.05 برای تغییرات بین‌گروهی

بحث و نتیجه‌گیری

فعالیت بدنی منظم به عنوان یک روش درمانی مهم در کنار دارو درمانی برای کمک به دانش‌آموزان بیش‌فعال در مدارس توصیه شده است (۳۵). در همین رابطه، پژوهش‌ها علل اختلال نقص توجه و بیش‌فعالی را در کودکان به عوامل هورمونی دوپامین و کاتکولامین‌ها نسبت داده‌اند (۳۵). هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثر ۱۲ هفته برنامه تمرین هوایی با شدت متوسط و بالا بر آمادگی قلبی تنفسی و سطوح کاتکولامین‌ها در دانش‌آموزان بیش‌فعال مقطع ابتدایی شهرستان اصفهان در سال تحصیلی ۹۰-۹۱ بود.

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ۱۲ هفته برنامه تمرین هوایی با شدت متوسط و بالا، منجر به افزایش معنادار در اوج اکسیژن مصرفی و کاهش معنادار در ضربان قلب استراحت و بهبود پاسخ‌های اپی‌نفرین و نوراپی‌نفرین در گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل گردید.

رسایی و همکاران (۳۶) نشان دادند تمرین استقامتی موجب کاهش خیلی سریع پاسخ‌های اپی‌نفرین و نوراپی‌نفرین پلاسمای کار ورزشی زیربیشینه می‌شود. براساس گزارش‌های پژوهشی آن‌ها، طی سه هفته اول تمرین، غلظت هر دو کاتکولامین به‌وضوح کاهش می‌یابد. علی‌رغم این مسئله، بسیج گلوکز از کبد و اسیدهای چرب آزاد از بافت چربی ادامه می‌یابد که نمایان گر پیچیدگی سیستم‌های کنترلی روی بسیج مواد سوختی است. با این‌همه، یک فرد تمرین‌کرده در جریان یک فعالیت خیلی پرفشار، ظرفیت بزرگ‌تری به‌منظور ترشح اپی‌نفرین در مقایسه با یک فرد تمرین‌نکرده دارد. این یافته با نتایج پژوهش حاضر هم‌خوانی دارد. این موارد نشان می‌دهند که تمرین‌های بدنی که سیستم عصبی سمپاتیک را براساس یک اصول منظم تحریک می‌کنند، ظرفیت غدد آدرنال را به‌منظور پاسخ به فعالیت‌های شدید افزایش می‌دهند. منشأ اپی‌نفرین موجود در خون، عموماً بخش مرکزی غدد فوق کلیوی است. غلظت هر دو هورمون اپی‌نفرین و نوراپی‌نفرین طی چند هفته اول تمرین به‌ نحو فاحشی کاهش می‌یابد. وجود ضربان قلب پایین نیز با افزایش اندک در فشارخون هنگام تمرین زیربیشینه بر اثر تمرین، احتمالاً شناخته‌ترین سیمای این پاسخ سمپاتیکی فوق کلیوی است.

دان کن^۱ و همکاران در گزارش پژوهشی خود، تغییرات فشار خون و کاتکولامین‌ها پس از ۱۶ هفته تمرین هوایی بر روی ۵۶ بیمار مبتلا به فشار خون متوسط گزارش نمودند. یافته‌های پژوهش آنها حاکی از اثرات تمرین هوایی بر کاهش فشار خون و سطوح کاتکولامین‌های خون بود (۳۷). این موضوع بیان کننده آن است که تمرین پیوسته و مداوم جهت درگیر کردن کامل واحد فوق کلیه لازم

1. Duncan

است. پاسخ سمپاتیکی فوق‌کلیوی و تمرین، ترجیحاً با مقدار نسبی و نه مقدار مطلق تمرین انجام شده مرتبط است. براین‌اساس، نتیجه‌گیری می‌شود که پاسخ سمپاتیکی فوق‌کلیوی، نسبت به یکبار معین، به‌ویژه در نوراپی‌نفرین در افراد تمرین‌کرده در مقایسه با افراد تمرین‌نکرده پایین‌تر است. چنان سازگاری نسبت به تمرین، پاسخ مطلوبی است؛ زیرا منجر به پایین‌آوردن نیازهای اکسیژن می‌کارد قلب، چه هنگام استراحت و چه در طول تمرین ضربان بیشینه، همچنین، هنگام دیگر انواع استرس‌ها می‌گردد. با این حال، در پژوهش‌ها به خوبی اثبات شده است که در انسان، پاسخ اپی‌نفرین پلاسمای ورزش در مقایسه با نوراپی‌نفرین کمتر است. افزایش زیاد در اپی‌نفرین پلاسمای تنها زمانی رخ می‌دهد که ورزش، منجر به توسعهٔ هیپوگلیسمی شود (۳). براساس یافته‌های پژوهش حاضر، افزایش در اپی‌نفرین پلاسمای قبل و بعد از تمرین، یکی از شواهدی است که ترشح اپی‌نفرین توسط غده آدرنال به موزات آزادسازی نوراپی‌نفرین توسط انتهای عصب سمپاتیک کنترل شده نیست.

همچنین، نتایج پژوهش حاضر حاکی از بهبود اوج اکسیژن مصرفی پس از ۱۲ هفته تمرین هوایی در گروه تجربی بود. پژوهش‌های قبلی اثربخشی فعالیت‌های ورزشی هوایی به صورت سه و پنج جلسه در هفته را در بهبود حداکثر اکسیژن مصرفی نشان داده‌اند (۳۹، ۳۸). نتایج پژوهش حاضر با مطالعات هارلی^۱ با سه جلسه تمرین در هفته و به مدت ۱۰ هفته روی مردان جوان (۴۰)، دبیدی روش (۴۱)، سردار (۴۲) و دوفیلد^۲ هم‌خوانی دارد. یافته‌های تمام این پژوهش‌ها بهبود حداکثر اکسیژن مصرفی را پس از انجام تمرین هوایی نشان داده‌اند. می‌توان افزایش $\text{VO}_{2\text{max}}$ نسبت به قبل از فعالیت ورزشی را نتیجهٔ سازگاری دستگاه‌های قلبی - عروقی، عضلانی و متابولیک با فعالیت‌های ورزشی عنوان کرد. این سازگاری‌ها شامل افزایش ظرفیت اکسیداتیو عضله‌ها (۳۷، ۴۳)، افزایش میزان کل هموگلوبین، افزایش سوتخت چربی و کاهش گلیکولیز، افزایش فعالیت آنزیم‌های چرخهٔ کربس و دستگاه انتقال الکترون (۴۳)، افزایش تعداد و اندازهٔ میتوکندری‌ها و افزایش بافت عضلانی و کارابی آنها دانست (۴۳).

پاسخ سیستم عصبی مرکزی یکی از عوامل درگیر در تنظیم پاسخ‌های فیزیولوژیکی و متابولیکی به نیازمندی‌های انرژی عضلات فعال است. یکی از مکانیسم‌هایی که ممکن است به‌واسطهٔ پاسخ سیستم عصبی مرکزی به ورزش نقش داشته باشد، تحریک بارورسپتورهای شریانی است (۴۴، ۴۵). احتمالاً، این مکانیسم نشان می‌دهد که طی ورزش، عروقی بسته در عضلات در حال فعالیت، گشاده می‌شوند که این منجر به کاهش مقاومت محیطی و فعال شدن بارورسپتورها می‌شود. فعال‌سازی

1. Hurly

2. Duffield

بارورسپتورهای شریانی، منجر به افزایش فعالیت سیستم عصبی مرکزی می‌گردد که بهنوبه خود، باعث انقباض دیگر عروق تخت و بسته شده و درنهایت، حفظ فشارخون را دربردارد. بهطورقطع، هرچه بار کار مطلق بالاتر باشد، منجر به کاهش بیشتری در مقاومت عروق در عضلات فعال می‌گردد و در نهایت، فعال شدن بارورسپتورها و تحريك سیستم عصبی مرکزی را در پی دارد. مکانیسم دوم ممکن است شامل فعال شدن رفلکس سمپاتیک از طریق اعصاب آوران عضلات باشد. تصور می‌شود این رفلکس به‌واسطه تحريك گیرنده‌های مکانیکی و انتهای عصب حساس شیمیایی در عضلات درحال انقباض صورت‌گیرد که منجر به فعال شدن سیستم عصبی مرکزی از طریق تارهای عصب نازک میلین و بدون میلین می‌گردد (۴۵-۴۷).

در مجموع، نتایج این مطالعه نشان داد که یک دوره تمرین هوازی با شدت متوسط و بالا، بر آمادگی قلبی تنفسی و بهبود هورمون‌های اپی‌نفرین و نوراپی‌نفرین دانش‌آموزان پسر دارای بیش‌فعالی مؤثر می‌باشد؛ لذا، براین اساس می‌توان نتیجه گرفت که تمرینات ورزشی هوازی با شدت متوسط و بالا، با تنظیم میزان کاتکولامین‌ها می‌توانند به عنوان یک روش پیشگیرانه برای به‌تعویق‌انداختن بیماری‌های مرتبط با بیش‌فعالی به عنوان یک روش غیرتهاجمی و غیردارویی مطرح باشند و خطر بالقوه ابتلا به برخی بیماری‌های مرتبط با روان‌پزشکی و نارسایی ناقل کاتکولامین در کرتکس قدامی (بیشانی) و نواحی قشری و مشکلات بسیاری در زمینه‌های مختلف آموزشی، عملکرد تحصیلی پایین، ضعف روحیه، پرخاشگری، ترک مدرسه، روابط خانوادگی و دوستانه ضعیف، اضطراب، افسردگی و نقص در بسیاری از مهارت‌ها را نیز کاهش دهند؛ لذا، پیشنهاد می‌شود مطالعات وسیع‌تر و با آزمودنی‌های بیشتری در زمینه اثر انواع دیگر تمرینات با شدت و مدت‌های مختلف بر آزمودنی‌های متفاوت از هر دو جنس و با اندازه‌گیری‌های شاخص‌های روان‌شناختی و دوپامین در کنار کاتکولامین‌ها صورت گیرد.

پیام مقاله: با توجه به اثربخش بودن تمرینات هوازی بر توان هوازی و سطوح کاتکولامین‌ها، پیشنهاد می‌شود، پزشکان متخصص از تمرینات ورزشی به عنوان مکمل درمانی در کنار دارو درمانی برای درمان علائم بیش‌فعالی در این کودکان مورد توجه قرار دهند.

تشکر و قدردانی

در اینجا لازم است از حمایت‌های مالی و معنوی معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان، همکاری سازمان آموزش و پژوهش استان اصفهان، مدیران و معلمان مدارس و کلیه دانش‌آموزان و والدین آن‌ها که ما را در این پژوهش یاری دادند صمیمانه قدردانی و تشکر به عمل آید.

منابع

- ۱) سادوک بنجامین جیمز، سادوک ویرجینیا الکوت. خلاصه روان‌پژوهشی. مترجم: پورافکاری نصرت‌الله. جلد سوم. تهران: نشر شهر آب؛ ۱۳۹۱.
- 2) Van der Oord S, Prins PJ, Oosterlaan J, & Emmelkamp PM. Efficacy of methylphenidate, psychosocial treatments and their combination in school-aged children with ADHD: a meta-analysis. *Clinical psychology review*. 2008; 28(5), 783-800.
- 3) Faraone SV, Sergeant J, Gillberg C, & Biederman J. The worldwide prevalence of ADHD: is it an American condition?. *World Psychiatry*. 2003;2(2), 104.
- ۴) خوشایی کتایون، ستاره فروزان آمنه، مرادی شهرام، محمدخانی پروانه. بررسی عوامل خطرزا در ابتلاء به بیشفعالی / کمبود توجه. *مجله توانبخشی*. ۱۳۸۵؛ دوره ۷، شماره ۳: ۶-۱۰.
- ۵) مرادی علی، خباز خوب مهدی، آگاه تهمینه، جواهرفروش زاده علی، رضوان بیژن، حائری کرمانی زهرا، و همکاران. شیوع بیشفعالی/نقص توجه (ADHD) در کودکان دیستانی شهر نیشابور طی سال تحصیلی ۸۵-۸۶. *مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرجستان*. ۱۳۸۷؛ ۱۰: ۴۲-۳۷.
- ۶) شهائیان آمنه، شهیم سیما، بشاش لعیا، یوسفی فریده. هنجاریابی، تحلیل عاملی و پایابی فرم کوتاه ویژه والدین مقیاس درجه‌بندی کاترز برای کودکان ۶ تا ۱۱ ساله در شهر شیراز. *نشریه مطالعات روان‌شناسی*. ۱۳۸۶؛ ۳(۳): ۹۷-۱۲۰.
- ۷) مژگان شوشتري. اثربخشی مداخلات زودهنگام مبتنی بر بازی‌های توجیهی بر میزان توجه کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه - بیشفعالی / تکانشگری. پایان نامه کارشناس ارشد روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص دانشگاه اصفهان، اصفهان، دانشگاه اصفهان؛ ۱۳۹۱.
- 8) Harpin V . The effect of ADHD on the life of an individual, their family, and community from preschool to adult life. *Arch Dis Child*. Arch Dis Child. 2005 Feb;90 Suppl 1:2-7.
- 9) Nair J, Ehimare U, Beitman B D, Nair S S, Lavin A. Clinical review: Evidence-based diagnosis and treatment of ADHD in children. *Missouri Medicine*. 2005; 103(6), 617-21.
- 10) Souza I, Serra M A, Mattos P, Franco V A. Comorbidadesem crianças adolescentes com transtorno do déficit de atenção: Resultados preliminares. *Arq Neuro-psiquiatr*. 2001; 59(2B): 401-6.
- 11) Hendren R L, De Backer I, Pandina G J. Review of neuroimaging studies of child and adolescent psychiatric disorders from the past 10 years. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry*. 2000; 39(7): 815-28.
- 12) Pliszka S R, McCracken J T, Maas J W. Catecholamine in attention-deficit/hyperactivity disorder: Current perspectives. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry*. 1996; 35(3): 264-72.
- 13) Zametkin A J, Rapoport J L. Neurobiology of attention deficit disorder with hyperactivity: Where have we come in 50 years. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry*. 1987; 26(5): 676-86.
- 14) Rowland A S, Umbach D M, Stallone L, Naftel J, Bohlig E M, Sandler D P. Prevalence of medication treatment for attention deficit-hyperactivity disorder among elementary school children in Johnston County, North Carolina. *American Journal of Public Health*. 2002; 92(2), 231-4.

- 15) Barkley R A. Attention - deficit /hyperactivity disorder: A handbook for diagnosis and treatment. New York: Guilford Publications; 2014.
- 16) Zametkin AJ, & Rapoport JL. Neurobiology of attention deficit disorder with hyperactivity: where have we come in 50 years? Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 1987; 26(5), 676-86.
- 17) Berridge CW, Devilbiss DM, Andrzejewski ME, Arnsten AF, Kelley AE, Schmeichel B, et al. Methylphenidate preferentially increases catecholamine neurotransmission within the prefrontal cortex at low doses that enhance cognitive function. Biological psychiatry. 2006; 60(10), 1111-20.
- ۱۸) دادستان پریرخ. روان‌شناسی مرضی تحولی: از کودکی تا بزرگسالی. جلد دوم. تهران: انتشارات سمت؛ ۱۳۷۸.
- ۱۹) کاکاوند علیرضا. اختلال نقص توجه/بیش فعالی (نظریه و درمان). کرج: نشر سرافراز؛ ۱۳۸۵.
- ۲۰) عابدی احمد، قوام علی. روان‌شناسی و آموزش کودکان با نقص توجه/بیش فعالی. اصفهان: نشر نوشه؛ ۱۳۸۸.
- 21) Centers for Disease Control. Effects of physical activity on health and disease: A report from the surgeon general; 2006. Retrieved from: <http://www.cdc.gov/nccdphp/sgr/prerep.htm>
- 22) Allen JK. Coronary risk factor modifications in women after coronary artery bypass surgery. Nursing Research. 1996; 45 (5): 260-5.
- 23) Blair S N. Physical activity, fitness and coronary heart disease. In C. Bouchard, R. J. Shephard, & T. Stephens (Eds.), Physical activity, fitness, and health: International proceedings and consensus statement. Champaign IL: Human Kinetics; 1994. p. 579-90.
- 24) Yeung R R. The acute effects of exercise on mood state. J Psychosom Res. 1996; 40(2): 123-41.
- 25) Stephens T. Physical activity and mental health in the United States and Canada: Evidence from four population surveys. Prev Med. 1988; 17 (1): 35-47.
- 26) Blumenthal J A, Babyak M A, Doraiswamy P M, Watkins L, Hoffman B M, Barbour K A, et al. Exercise and pharmacotherapy in the treatment of major depressive disorder. Psychosom Med. 2007; 69 (7): 587-96.
- 27) Biddle SJH. Children, exercise, and mental health: International Journal of Sport Psychology. 1993; 24 (2): 200-16.
- 28) Wittert G. The effect of exercise on hypothalamus-pituitary-adrenal axis. In M. P. Warren & N. W. Constantine (Eds.), Sports endocrinology. Ottawa, Ontario, Canada: Human Press. 2000.p. 43-55.
- 29) Kramer AF, Hahn S, Cohen NJ, Banich M , McAuley E, Harrison CR, et al. Ageing, fitness and neurocognitive function. Nature. 1999; 400 (6743): 418-9.
- 30) Hillman CH, Motl RW, Pontifex MB, Posthuma D, Stubbe JH, Boomsma DI, et al. Physical activity and cognitive function in a cross-section of younger and older community-dwelling individuals. Health Psychol. 2006; 25 (6): 678-87.

- 31) Kubesch S, Bretschneider V, Freudenmann R, Weidenhammer N, Lehmann M Spitzer M, et al. Aerobic endurance exercise improves executive function in depressed patients. *J Clin Psychiatr.* 2003; 64 (9): 1005-12.
- ۳۲) علیزاده ح. تبیین نظری اختلال نارسایی توجه/ بیشفعالی: الگوی بازداری رفتاری و ماهیت خودکنترلی. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی ۱۷، سال پنجم، ش. ۳، پاییز ۱۳۸۴: ۸۴-۲۲۳.
- 33) Ahmed G, Mohamed S. Effect of regular aerobic exercise on behavioral, cognitive and psychological response in patients with attention-deficit/hyperactivity disorder. *Life Science Journal.* 2011; 8(2), 366-71.
- 34) Gapin JI, Labban JD, & Etnier JL. The effects of physical activity on attention deficit hyperactivity disorder symptoms: the evidence. *Preventive Medicine.* 2011; 52, 70-4.
- 35) Azrin N, Ehle C, Vinas V. Physical exercise as a reinforcer to promote calmness of an ADHD child. *Behavior Modification.* 2006; 30(5): 564-70.
- ۳۶) رسایی محمدجواد، گائینی عباسعلی، نظام فرزاد. سازگاری هورمون و ورزش. تهران: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس؛ ۱۳۷۳.
- 37) Duncan JJ, Farr JE, Upton SJ, Hagan RD, Oglesby ME, Blair SN.. The effects of aerobic exercise on plasma catecholamines and blood pressure in patients with mild essential hypertension. *JAMA.* 1985; 254(18): 2609-13.
- 38) Baquet G, Van Praagh E, & Berthoin S. Endurance training and aerobic fitness in young people. *Sports Medicine.* 2003; 33(15), 1127-43.
- 39) Wernbom, M., Augustsson, J., & Thomeé, R. The influence of frequency, intensity, volume and mode of strength training on whole muscle cross-sectional area in humans. *Sports Medicine.* 2007; 37(3), 225-64.
- 40) Hurley RS, Bossetti BM, O'Dorisio TM, Tenison EB, Welch MA, Rice RR. The effect of exercise training on body weight and peptide hormone patterns in normal weight college-age men. *The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness.* 1991 Mar;31(1):52-6.
- ۴۱) دبیدی روشن ولی الله. بررسی تأثیر تمرینات منتخب درس تربیتبدنی بر برخی ویژگی‌های ساختاری و فیزیولوژیکی دانشآموزان غیرورزشکار. پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه تهران؛ ۱۳۷۸.
- ۴۲) سردار محمدعلی. تأثیر و مقایسه ۲ روش تمرین آمادگی جسمانی بر قابلیت‌های جسمانی و حرکتی دانشجویان تربیتبدنی دانشگاه مشهد. پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه تهران؛ ۱۳۷۸.
- 43) Williams M H. Lifetime physical fitness: Personal choice. Dubuque, Iowa: W.C. Brown; 1985. p .77.
- 44) Rowell LB. Neural control of muscle blood flow: Importance during dynamic exercise. *Clin Exp Pharmacol Physiol.* 1997; 24 (2): 117-25.
- 45) Rowell L B, O'Leary D S. Reflex control of the circulation during exercise: Chemoreflexes and mechanoreflexes. *J Appl Physiol.* 1990; 69 (2): 407-18.
- 46) Adreani CM, Kaufman MP. Effect of arterial occlusion on responses of group III and IV afferents to dynamic exercise. *J Appl Physiol.* 1998; 84 (6): 1827-33.

47) Thomas GD, Chavoshan B, Sander M, Victor RG. Invited editorial on "Effect of arterial occlusion on responses of group III and IV afferents to dynamic exercise". J Appl Physiol. 1998; 84 (6): 1825–6.

ارجاع دهی به روش ونکوور

افرasiabی صالح، کارگرفد مهدی. اثر ۱۲ هفته تمرین هوایی بر سطوح کاتکولامین‌ها و آمادگی قلبی تنفسی دانشآموزان مبتلا به اختلال بیشفعالی/ نقص توجه. فیزیولوژی ورزشی. تابستان ۱۳۹۴؛ ۲۶(۷): ۱۱۳-۲۶.

**The effects of 12-weeks aerobic exercise on catecholamine's levels
and cardiorespiratory fitness in children with attention deficit
hyperactivity disorder**

S .Afrasyabi¹, M .Kargarfard²

1. MS.c of University of Isfahan
2. Associate Professor at University of Isfahan*

Received date: 2014/02/16

Accepted date: 2014/12/22

Abstract

The purpose of present study was to determine the effect of 12 weeks aerobic exercise on catecholamine's levels and cardiorespiratory fitness in children with attention deficit hyperactivity disorder. The study presented is a quasi-experimental pre-test/post-test control group design. 60 school age boys children diagnosed with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) through the Caners diagnostic questionnaire aged 8-11 years old volunteered to participate in the study and were selected randomly and assigned to control [n=30, (mean \pm SD) age 10.53 \pm 1.14 years, body mass 29.75 \pm 4.80 kg, body mass index 18.06 \pm 1.97 kg.m², peak O₂ uptake 26.77 \pm 6.84 ml.kg.mim⁻¹] and experimental [n=30, (mean \pm SD) age 10.67 \pm 1.18 years, body mass 30.42 \pm 4.01 kg, body mass index 18.14 \pm 1.73 kg.m², peak O₂ uptake 26.14 \pm 5.06 ml.kg.mim⁻¹] groups. The experimental group participated in an aerobic exercise program consisted of 45-min sessions for three days per week for 12 weeks at 60–85% of heart rate reserve. During this period, the control group did not participate in any regular physical activity program. Urine samples were collected for components of the catecholamines and peak O₂ uptake was measured using the Bruce maximal progressive treadmill test for measuring cardiorespiratory fitness were administered to participants before and after the twelve week treatment. Data were analyzed using one-way repeated measures analysis of variance (ANOVA). After 12 weeks aerobic exercise training significantly increased peak O₂ uptake and decreased rest heart rate and epinephrine in experimental group than control group ($P<0.05$). Despite significant decreased norepinephrine levels in experimental group ($P<0.001$), there were no differences in norepinephrine levels between the groups ($P>0.05$) after 12 weeks aerobic exercise training. The findings of this study suggest that a 12 weeks aerobic exercise training program may be effective in improving catecholamine's levels specially epinephrine and cardiorespiratory fitness of school age children with ADHD.

Keywords: Cardiorespiratory fitness, Catecholamine's, Children with hyperactive disorder, Aerobic exercise

* Corresponding author

E-mail: m.kargarfard@spr.ui.ac.ir